

Fleet® Phospho-soda®

Czyste jelita,
komfort, wygoda,
Fleet® Phospho-soda®

FERRING
PHARMACEUTICALS

Fleet® Phospho-soda®

Szanowny Panie Doktorze,

Niniejszy materiał został wydany z myślą o dobrym przygotowaniu pacjentów do badań endoskopowych, radiologicznych oraz innych badań i zabiegów z wykorzystaniem preparatu Fleet® Phospho-soda®.

W razie potrzeby nasz przedstawiciel dostarczy Panu Doktorowi kolejne egzemplarze instrukcji. W tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym firmy Ferring.

.....
Imię i nazwisko przedstawiciela

.....
tel. kontaktowy

Dzień przed badaniem lub zabiegiem:

Wodę niegazowaną można pić w dowolnej ilości, jednak nie mniej niż w podanym schemacie.

Godzina 7.00

1



woda lub inne płyny
240 ml



woda + Fleet® Phospho-soda®
120 ml + 45 ml



woda lub inne płyny
240 ml

Zamiast śniadania wypić co najmniej 1 szklankę wody lub innego płynu (bulion lub inna zupa przecedzona, sok owocowy bez pulpy owocowej, herbata, napoje niegazowane). Następnie przyjąć pierwszą dawkę leku. Zawartość pierwszej butelki leku (45 ml) wymieszać z 1/2 szklanki (120 ml) zimnej wody. Powstały roztwór wypić, popijając co najmniej 1 pełną szklanką (240 ml) zimnej wody.

Godzina 13.00

2



woda
240 ml



woda
240 ml



woda
240 ml

Zamiast obiadu wypić co najmniej 3 pełne szklanki (720 ml) wody lub innego płynu.

Godzina 19.00

3



woda lub inne płyny
240 ml



woda + Fleet® Phospho-soda®
120 ml + 45 ml



woda lub inne płyny
240 ml

Zamiast kolacji wypić co najmniej 1 szklankę wody lub innego płynu. Następnie przyjąć drugą dawkę leku. Zawartość drugiej butelki leku (45 ml) wymieszać z 1/2 szklanki (120 ml) zimnej wody. Powstały roztwór wypić, popijając co najmniej 1 pełną szklanką (240 ml) zimnej wody.

W dniu badania lub zabiegu:

Wodę niegazowaną można pić w dowolnej ilości. Picie wody należy zakończyć 6 godzin przed planowanym badaniem lub zabiegiem.

Fleet® Phospho-soda®

PAMIĘTAJ!



48

godzin przed
badaniem

**dieta
ubogoresztkowa**

ryż, makaron, bulion, chleb, gotowane
lub smażone mięso i ryby, przecedzone
soki, herbata, niegazowane napoje

24

godziny przed
badaniem

dieta płynna

woda, bulion, przecedzone zupy i soki,
herbata, niegazowane napoje orzeźwiające

**nie należy
spożywać!**

sałatek, warzyw, owoców, mięsa i ryb z sosami,
kiełbasy, mleka, tłuszczów, kawy i gazowanych
napojów

Szanowni Państwo!

Przed zastosowaniem leku Fleet® Phospho-soda® proszę zapoznać się z ulotką dla pacjenta umieszczoną wewnątrz opakowania. W razie pytań lub wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub przedstawicielem firmy Ferring. Numer telefonu do Ferring Pharmaceuticals w Polsce znajduje się poniżej.



FERRING PHARMACEUTICALS B.V. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Królowej Marysieńki 11 m. 4, 02-954 Warszawa

tel. (+48 22) 842 71 00, 651 89 30, tel./fax (+48 22) 651 89 39, (+48 22) 842 69 68

Fleet® Phospho-soda®

MAŁA OBJĘTOŚĆ, DOBRY EFEKT



Skrócona informacja o leku:

Fleet® Phospho-soda®, roztwór doustny, (24,4 g + 10,8 g) / 45 ml

Skład:

45 ml roztworu zawiera:

Sodu dwuwodorofosforan 24,4 g

Sodu wodorofosforan 10,8 g

45 ml roztworu zawiera 5,0 g sodu

Substancje pomocnicze:

Glicerol

Sacharyna sodowa

Sodu benzoesan (E 211)

Aromat imbirowo-cytrynowy

Woda oczyszczona

Wskazania:

Oczyszczanie jelita grubego do:

- badań endoskopowych
- badań radiologicznych
- zabiegów chirurgicznych
- diagnostyki

Przeciwwskazania:

- podejrzenie lub potwierdzona niedrożność jelit
- perforacja jelit
- zastoinowa niewydolność krążenia
- ciężka niewydolność nerek
- wrodzone lub nabyte rozszerzenie okrężnicy (megacolon)
- czynna faza choroby zapalnej jelit
- nudności, wymioty lub bóle brzucha
- nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
- kliniczne objawy zaburzeń elektrolitowych i odwodnienie
- dzieci poniżej 15 roku życia
- ciąża i okres karmienia piersią

Środki ostrożności:

U pacjentów w podeszłym wieku, bardzo szczupłych, z zaburzeniami czynności nerek, chorobami serca, kolostomią, zaburzeniami gospodarki elektrolitowej oraz w przypadku stosowania diety niskosodowej istnieje możliwość wystąpienia hiperfosfatemii, hipokalcemii, hipokaliemii, odwodnienia z towarzyszącą hipematremią lub kwasicy. Rzadko może występować niewielkie wydłużenie

odstępu QT jako wynik nierównowagi elektrolitowej, takiej jak hipokalcemia lub hipokaliemia. Klinicznie zmiany te są bez znaczenia.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dzień przed zabiegiem lub badaniem:

Godzina 7:00 - zamiast śniadania wypić co najmniej 1 szklankę wody lub innego płynu (bulion lub inna zupa przecedzona, sok owocowy bez pulpy owocowej, herbata, napoje niegazowane). W razie pragnienia można wypić więcej. Następnie przyjąć pierwszą dawkę leku. Zawartość jednej butelki leku (45 ml) wymieszać z 1/2 szklanki (120 ml) zimnej wody. Powstały roztwór wypić, popijając co najmniej 1 pełną szklanką (240 ml) zimnej wody.

Godzina 13:00 - zamiast obiadu wypić co najmniej 3 pełne szklanki (720 ml) wody lub innego płynu.

Godzina 19:00 - zamiast kolacji wypić co najmniej 1 szklankę wody lub innego płynu.

Następnie przyjąć drugą dawkę leku. Zawartość drugiej butelki leku (45 ml) wymieszać z 1/2 szklanki (120 ml) zimnej wody. Powstały roztwór wypić, popijając co najmniej 1 pełną szklanką (240 ml) zimnej wody.

Jeśli nadal występuje pragnienie, wodę lub inne płyny można pić do godziny 24:00.

Interakcje:

Podczas stosowania preparatu Fleet® Phospho-soda®, wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego może być opóźnione lub całkowicie zablokowane.

Działania niepożądane:

Nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, kurcze jelit i biegunka, osłabienie, dreszcze, bóle i zawroty głowy, reakcje alergiczne z wysypką lub bez wysypki skórnej oraz uczucie zmęczenia. Podczas endoskopii bardzo rzadko obserwuje się pojedyncze lub mnogie, punktowe, podobne do aft zmiany, zlokalizowane w prośnicy i esicy. Zmiany te nie mają znaczenia klinicznego i ustępują bez leczenia.

Pozwolenie Nr 9441



FERRING PHARMACEUTICALS B.V. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Królowej Marysienki 11 m. 4, 02-954 Warszawa

tel. (+48 22) 842 71 00, 651 89 30, tel./fax (+48 22) 651 89 39, (+48 22) 842 69 68